

67979

# GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE  
VERENIGING  
VOOR  
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET  
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever  
Alfons Pellegrons  
Braamstraat 153  
2120 Schoten  
031/58.65.52

Secretariaat  
Rene Swaelen  
Acacialaan 13  
2630 Aartselaar  
031/88.34.06

Inlichtingen-Redactie  
A.Vereycken  
031/45.92.30

Bankrekening  
Belgische Vereniging  
voor Conchyliologie v.z.w.  
(Gloria Maris)  
610/4465950/64

VLIZ (vzw)  
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE  
FLANDERS MARINE INSTITUTE  
Oostende - Belgium

VOLUME 20 NR. 9

NOVEMBER 1980

---

1. Zaterdag 8 november 1980 - LEIDEN  
Gezamenlijke vergadering met de Nederlandse  
Malacologische Vereniging  
inlichtingen en programma zie blz. 179 maandblad  
6 oktober
2. De jeugd heeft de mogelijkheid aan deze uitstap  
deel te nemen. Zondag 2 november geen vergadering.
3. Vrijdag 14 november 1980 te 20 uur in het lokaal  
Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de  
studiegroep XENOPHORA onder leiding van de heer Wils.
4. Vrijdag 21 november 1980 te 20 uur in het lokaal  
Ommeganckstraat 26 Antwerpen : vergadering van de  
RAAD VAN BEHEER ( + inbinden en verzenden maandblad )
5. Zaterdag 15 november 1980 in het lokaal Stella Maris  
Italiëlei 72 Antwerpen - vergadering van de werkgroep  
ARGONAUTA


NOTA : Zondag 2 november GEEN vergadering in Stella Maris

Datum van uitgifte : 17 oktober 1980

CRASSOSTREA ANGULATA ( LAMARCK 1819 )

PORTUGESE OESTER

*Crassostrea angulata*  
is oorspronkelijk af-  
komstig uit de monding  
van de Taag in Portugal,  
vandaar de benaming  
" Portugese oester ".



Men kan haar gemakkelijk  
onderscheiden van de gewone oester  
( *Ostrea edulis* ). Zij is smaller en langwerpig  
van vorm, de bolle klep is veel dieper dan de platte klep,  
de omtrekrand is meestal sterk geplooid.

De oppervlaktesculptuur is schubbig en schilfert vlug af.  
De schelp is ondoorschijnend en dof.  
Zij is geel-achtig van kleur met paarse vlekken.

De binnenzijde is wit met paars-bruine vlek van het spier-  
indruksel.

Zij wordt tot 12 cm hoog en 6 cm breed. Er zijn geen  
slottanden. De slotband is grotendeels inwendig met links  
en rechts van de slotband een kartelrand.

Het vlees van de Portugese oester is taaier en van minder  
fijne smaak als dit van de gewone oester.

Zij worden voornamelijk gekweekt aan de Franse westkust.